

Fagus sylvatica 'Atropunicea' - Vérbükk



Növekedés: 20-25 m, magasra boltozott, vagy gömbölyded koronájú fa. Törzse világosszürke, sima, vesszői szürkés barnák. Barna rügyei orsó alakúak, hegyesek, elállóak, selyem szőrösek, 1,5-3 cm hosszúak.

Levél: Kihajtás után sötét bordó színűek, később feketés vörösek. A széles levél tojásdad, vagy elliptikus, 4-10 cm hosszú, 2,5-7 cm széles, hegyes csúcsú, lekerekített, vagy széles ékvállú. Ép, vagy kissé fogazott szélűek, élük kissé hullámos és pillás. A levélnyél rövid, 5-10 mm. Későn lombosodik.

Virág: Jelentéktelen virágai lombfakadás után nyílnak.

Termés: Az 1-2 cm-es makktermés októberben érik.

Termőhely, igény: Mélyrétegű, közepkötött, jó vízellátású meszes talajokon, páradús, nem szennyezett levegőn fejlődik jól. Fényigényes.

Felhasználás: Parkok, kertek egyik legszebb alakú fája. Igényeinek megfelelő helyen sövénynek is nevelhető.

Származás: Svájc 1680

Fagus sylvatica 'Dawcyk Purple' - Oszlopos vérbükk



Növekedés, alak: 10-15 m magas, 3-4 m széles, zárt, oszlopos koronájú, kihegyesedő csúcsú fa. Törzse világos szürkésbarna, sima. Orsó alakú, hegyes barna rügyei 1,5-3 cm hosszúak, elállóak, selymesen szőrösek.

Levél: Sötét bíborvörös, 4-12 cm hosszúak, szélességük 3-7 cm. Szélük ép, hullámos, sekélyen csipkés vagy fogas, a levél erek (5-9 pár) mentén fiatalon selymes szőrzettel. A levél színét végig megtartja. Az oldalágak csúcsa befelé hajlik. Leveleik hegyes csúcsúak, ék vállúak, rövid, 0,5-1 cm levélnyéllal.

Virág: Jelentéktelen, májusban nyílik.

Termés: 1-2 cm-es, fényes barna makk, októberben érik.

Termőhely, igény: Mélyrétegű, közepes vízellátású, meszes, enyhén savas, tápdús talajokon fejlődik jól. Fényigényes.

Felhasználás: Örökzöldek, színes lombú fák közelébe ültessük. Kiváló szoliter növény.

Származás: Hollandia 1968

Fraxinus angustifolia 'Raywood' - Keskenylevelű kőris



Növekedés, alak: Közepesen nagy, vagy nagy fa, 15-20 m magas, 10-12 m széles, tojás alakú, kissé szabálytalan koronával. Egyenes törzsű, felálló ágrendszerű, közepesen gyorsan növő.

Levél: Páratlanul, szárnyasan összetett, 9-13 levélkével, melyek keskenyek, kihegyezettek, ülők, ép szélűek vagy ritkán finoman fogazottak, színén fénylő sötétzöldek, fonájuk halványabb, kopasz. A levélke 12-20 cm hosszú, 4-5 cm széles. Őszi lombszíne szeptember végén lilászvörös.

Virág: Sárgászöld buga, áprilisban nyílik.

Termés: Ritkán, idősebb korban száraz körülmények között. Lependék termése lekerekített csúcsú, 3-4 cm hosszú, bordólilásra színeződik.

Termőhely, igény: Mészkedvelő, szárazabb, jó vízelvezetésű talajt kedveli, fényigényes, melegkedvelő. Ilyen talajokon, illetve fekvésben hosszabb, intenzívebb az őszi lombszíneződése. Fagyűrő, várostűrő, a hőséget is elviseli.

Felhasználás: Nagyobb parkok, kertek igénytelen szoliter fája, széles utakra, utcákra ajánlott.

Származás: Ausztrália, de a faj Dél-Európában, Kis-Ázsiában is honos 1920

Fraxinus excelsior 'Jaspidae' – Sárga vesszőjú kőris



Növekedés, alak: 10-15 m magas, gömbölyded koronájú, terebélyes fa, törzse egyenes, vesszői, gallyai sötétebb sárgák, helyenként zöldes csíkozásúak. Sötétszürke-fekete rügyei a hosszú hajtásokon ritkásan, a rövid hajtásokon, ágakon sűrűn állnak. A vessző csúcs rügye félgömb alakú, a rügyalap széles. Az oldalrügyek csúcsa a vízszinteshez közelít. A vessző kissé paraszemölcsös.

Levél: Levelei 20-30 cm-esek, 7-13 levélkével, melyek széles lándzsásak, 5-10 cm hosszúak, 1,5-3 cm szélesek, ülők, szabálytalanul fűrészfogasak, hegyesek, kissé visszagömbülnek. Levelei nyáron világos sárgászöldek, ősszel aranysárgák.

Virág: Szirmolevél nélküli, felemás virágai lombfakadás előtt (vagy azzal egy időben) 6-12 cm-es bugában, közel egy hétig nyílnak. A portokok lilák.

Termés: 2-5 cm-es termése világossárga, enyhén csavarodott, a mag lapos.

Termőhely, igény: Mélyrétegű, jó vízellátású, tápdús talajt igényel. Fényigényes.

Felhasználás: Szabad állásba ültessük, szoliter fának, lehetőleg vörös lombú fák mellé. Télen is dekoratív.

Származás: Franciaország 1802

Fraxinus excelsior 'Pendula' - Csüngő kőris



Növekedés: 8-12 m magasra is megnő, szélessége 7-8 m. Ágai nagy ívben lehajlanak, a vesszők a talajszintig lecsüngenek. Erős növekedésű. Vesszői zöldesszürkék. Félgömb alakú rügyei feketék.

Levél: A levél 20-30 cm –es, 7-11 levélkével, melyek széles lándzsásak, 6-10 cm hosszúak, 1,5-4 cm szélesek, szabálytalanul sűrűn fogazottak. A levél lemez felül sötétzöld, fénytelen, kihegyezett csúcsú, lekerekített vagy ékvállú. Ősszel sárgára színeződik.

Virág: Szirmok nélküli, felemás virágai lombfakadás előtt, vagy azzal egy időben nyílnak, tömött bugában.

Termés: Kicsipett csúcsú termése 3-4,5 cm hosszú. A mag lapos.

Termőhely, igény: Fény- és mészkedvelő. Mérsékelten meleg, jó vízellátású és tápanyaggal ellátott talajt igényel.

Felhasználás: Szoliter fa, parkfa. Temető kertekbe is ültethető.

Származás: Anglia 1725

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' - Magas kőris



Növekedés, alak: nagy fa, széles kúp, később gömbölyded alakú, szabályos, zárt koronával. 20-25 m magas, 10-15 m széles, éves növekedése 40 cm.

Levél: nagy: 20-30 cm, 7-13 levélkével, melyek 5-10 cm hosszúak, 1,5-4 cm szélesek, fogazott szélűek, a fűrészfogak begömbülnek, sötétzöldek, fénylőek. A levélké a fonák felé kanalasan begömbülnek. Késői fakadása bronzos, barnás. Ősszel sárga.

Virág: nem feltűnő, apró.

Termés: nagyon ritka, gyakran hiányzik.

Termőhely, igény: mérsékelt meleg, víz- és tápanyagigényes. Fény- és mészkedvelő, de a gyengén savas talajokon is megél.

Felhasználás: Hollandiában az egyik leggyakrabban használt sorfa, hamar árnyékot adó, jó várostűrő.

Származás: Hollandia 1949

Fraxinus ornus - Virágos kőris



Növekedés, alak: 10-15 m magasra növő, laza, kúpos, majd gömbölyded, később ellaposodó koronájú fa. Kérge szürke, sokáig sima. Gömbölyded rügyei molyhosak, szürkék, ritkán világos barnák.

Levél: Összetett, 15-20 cm-es, 7 levélkével, melyek 4-8 cm szélesek, hosszúkásak, szélük szabálytalanul fűrészkes. A levélváll ék alakú, kissé részaránytalan, csúcsuk hegyes. A levél színe sötét vagy szürkészöld, a fonákon világosabb színű, alapjuk a főér mentén, barnán szőrös. A csúcs levélkéik visszás tojásdadok. Őszi lombszín sárgás, vöröses, lilás, barnás árnyalatú.

Virág: Sárgás-fehér, ezüstös, keskeny szirmú, felemás, illatos virágai végállóak, lombfakadás után, bugákban nyílnak.

Termés: 2-2,5 cm hosszú, változatos alakú, a mag hengeres.

Termőhely, igény: Jó vízáteresztő, meszes, meleg, mérsékelten száraz talajokon érzi jól magát. A szárazságban levelei meglankadnak, a levélkéik besodródznak. Eső vagy öntözés után a levelek kisimulnak.

Felhasználás: Sorfaként városokba, száraz déli lejtők, kopárosok fásítására kiválóan alkalmas.

Származás: Közép-Európa déli része, őshonos

Fraxinus ornus 'Mecsek' - Gömbkőris



Növekedés, alak: Gyenge növekedésű, közép-nagy, szabályos kerekded, vagy lapított kúp alakú koronával. Ágrendszere sűrűn elágazó.

Levél: Összetett, 15-20 cm-es, 7 levélkével, melyek 4-8 cm szélesek, hosszúkásak, szélük szabálytalanul fűrészkes. A levélváll kissé részaránytalán, csúcsuk hegyes. A børszerű, sötétzöld levél a fonákon a főér mentén barna, szőrös.

Virág: 10-15 cm, sárgásfehér, keskeny szirmú, illatos végálló buga. Májusban virágzik.

Termés: Kevés.

Termőhely, igény: Száraz, meszes talajt kedveli. Napos helyre ültessük.

Felhasználás: Városban az egyik legjobban használható kőris. Melegkedvelő, hőséget, várost elviselő faj, fajta. Szűk utcák fásításához kitűnő, de a koronát néha meg kell fiatalítani, mert nem törpe növény!

Származás: Magyarország 1970

Fraxinus pennsylvanica 'Urbanite' - Ezüst levelű kőris



Növekedés, alak: Tompa kúp alakú, később széles koronájú, 15-17 m magas, 10-12 m széles, középerős növekedésű fa. Kérge szürkés barna, mélyen barázdált. A vesszők ezüstösen hamvasak, vastagok, hengeresek, a rügynél is, nagyon keményfájú. Csúcsrügyei nagyok, gömbölyűek, élénk barnák.

Levél: A 15-25 cm hosszú levélen általában 4 levélpár található, 3-5cm szélesek, kihegyezett csúcsúak, a csúcslevél 5-7 cm széles, lekerekített, a levélkék rövid levélnyelűek, a levélnyél 0,5 cm hosszú. A sötétzöld, vastag, bőrszerű levél fonáka ezüstös, kopasz. A levéllemez ép szélű, kissé hullámos. Ősszel, narancs-fényes, bronzos bordó, bíbor színűek.

Virág:

Termés: Hazánkban, idős korban meleg, forró években kevés termést hoz. (Az irodalom hím virágúnak tartja). Levélhóraljban, laza, csüngő bugában álló termése 3-6 cm hosszú, 6-9 mm széles, a szárny a hengeres mag közepénél is tovább ér.

Termőhely, igény: Nagyon igénytelen, betegség és rovar rezisztens, a szennyezett nagyvárosi környezetet is jól tűri. A száraz és nyirkos helyeken egyaránt jól fejlődik. A magasabb sótartalmat is kielégítően elviseli, a talaj kémhatására sem érzékeny. Fényigényes, de a félárnyékot is tűri.

Felhasználás: Nyitott terek, szélesebb utcák kiváló, mutatós lombosított sorfája.

Származás: USA

Ginkgo biloba - Páfrányfenyő



Növekedés, alak: Sudaras törzsű, világosszürke kérgű, fiatalon keskeny kúp alakú, idősebb korban szabálytalanul szétterülő koronájú, laza ágrendszerű, 40 méter magasra is megnövő fa. A porzós, termést nem hozó fajtái karcsúbb koronájúak.

Levél: A hosszú hajtásokon szórta, a rövid hajtásokon 3-5 –ével, csomóban állnak vastag, legyező alakú levelei, melyek mélyen hasadtak, vagy szabálytalanul csipkés karéjosak, a hosszú levélnyel felé elkeskenyedő vállúak. A főér nélküli éretet sugár irányban szétfutó, a végén villásan elágazó. Ősszel aranyárgára színeződnek.

Virág: Virága kétlaki. A barkaszerű hímvirágok és a hosszú kocsányú nővirágok a rövid hajtások hónaljában jelennek meg, nem feltűnőek.

Termés: Kettős burkú magja éretten sárga szilvára emlékeztet, héja fehéres, hamvas. A lehullott gyümölcs húsa rendkívül kellemetlen szagú. A csontszerű, édes magját étkezésre is felhasználják.

Termőhely, igény: Igénytelen, a szennyezett városi levegőt jól tűri.

Felhasználás: Kiváló utcai sorfa. Érdekes leveleivel, jellegzetes habitusával a legszebb díszfák egyike.

Származás:

Gleditsia triacanthos 'Skyline' - Lepényfa



Növekedés, alak: 15-20 m magasra növő, 6-8 m széles, tojásdad vagy kerek koronájú fa. Kérge szürke, ágai vöröses vagy olajbarnák.

Levél: 20-30 levélkével összetett, párosan szárnyalt, hosszúkás, tojásdad levélkéi 2 cm nagyok, sötétzöldek, ősszel aransárgára színeződnek.

Virág: Világoszöld fürt, június-júliusban virágzik.

Termés: Ritkán, keveset terem, sötétbarna, csavarodott termése 30-35 cm hosszú. 3-4 cm széles, fel nem nyíló hüvely.

Termőhely, igény: Talajjal szemben nem válogatós, sovány, száraz, gyengén szikes talajon is megél. Napos helyre való.

Felhasználás: Parkokba, utcáknak.

Származás: Észak-Amerika 1957

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' - Sárgalevelű lepényfa



Növekedés, alak: Az alapfajhoz hasonló habitusú, de annál kisebb, lassabban növő fa. 8-12 m magas, 6-7 m széles. Évi növekedése 25 cm. Tüskétlen.

Levél: Összetett, párosan szárnyalt (8-14 levélke), váltakozva állók, 20-30 cm hosszúak, az egyes levélkéik hosszúkásak, 3 cm-esek. Eleinte aranysárga, később visszazöldülő sárgás halványzöld színű. Őszi lombszíne barnás.

Virág: Jelentéktelen, apró, sárgászöld virágai nyár elején fűrtben nyílnak.

Termés: Nincs, vagy csak ritkán.

Termőhely, igény: Talajjal szemben igénytelen, fény- és melegkedvelő, szárazságtűrő.

Felhasználás: Parkfának és sorfának is alkalmas. Szép aranysárga lombja csak napfényben érvényesül.

Származás: USA 1947

Juglans regia - Közönséges dió



Növekedés, alak: Magasra boltozott, gömbölyded, laza koronájú, 15-20 m magas. A kéreg világosszürke, később szürke, repedezett. Vastag ágai szétterülnek. Fényes, zölde-szürke hajtásai világos paraszemölcsösek.

Levél: 25-35 cm hosszú, 5-9 levélkéjű. A levélkék 6-12 cm-esek, hosszúkás tojásdadok, röviden kihegyezett csúcsúak, lekerekített vállúak, ép szélűek. A csúcslevél a többinél nagyobb, nyeles, az oldallevélkék szinte ülőek.

Virág: A sárga hím virágok a vesszőn fejlődnek ki, barkában csoportosulnak. A zöld, gömbölyű nő virágok a hajtások csúcsán májusban jelennek meg.

Termés: 4-5 cm átmérőjű, sárgászöld, gömbölyded, sima, már a fán felreped. A mag ellipszoid alakú, két oldalt kiemelkedő bordával, a csonthéj ráncai lekerekítettek.

Termőhely, igény: Mély rétegű, tápdús, jó vízellátású, meszes talajt igényel. Melegigényes, fénykedvelő, szabad állásban fejlődik jól.

Felhasználás: Nagyobb házi kertekbe, széles előkertes utcákba. A gyökerekből és a lehullott levelekből kioldódó anyagok más növények fejlődésére károsak. Kiváló bútorfá és ehető, egészséges, magas olaj tartalmú termése keresett.

Származás: Délkelet-Európa, Kis-Ázsia, őshonossága vitatott (a rómaiak már termesztették)

Koelreuteria paniculata - Csörgőfa



Növekedés: 6-10 m-es terebélyes fa, kezdetben gömbölyded, majd kiszélesedő, ellaposodó koronával. A vesszők sötét sárgásbarnák, vastag, kopasz vesszőkkel, gyakran csúcsrügy nélkül. Hajtásai szőrösek.

Levél: Szórt állású, egyszeresen vagy kétszeresen páratlanul szárnyalt levelekkel. 25-35 cm-es levelei 7-15 tojásdad levélkéjűek, melyek 3-7 cm hosszúak, hegyesek, ékvállúak, durván és egyenlőtlenül csipkésen vagy kétszeresen fűrészesek, vagy felfelé mélyebben hasítottak, vagy szeldeltek. Középzöldek. A legalsó és legfelső levelek a legkisebbek. Ősszel sárgás, narancsbarnás lombszínű.

Virág: 1 cm-es sárga, egyivarú vagy felemás virágai nagy végálló bugákban nyílnak június végén, július elején. 4 keskeny felfelé álló szirm van, a csésze szabálytalan, mélyen 5 cimpájú. A porzók száma 5-8.

Termés: Hártyás falú, felül nyitott tok, 3 csúcsú, barnás, 4-5 cm hosszú, benne 3 borsó nagyságú, kerek, fekete maggal.

Termőhely, igény: Igénytelen, lazább talajokra való. Meleg és fénykedvelő. Szárazság és város tűrő, a talaj kémhatására nem igényes.

Felhasználás: Az egyik legvárostűrőbb, a szennyezett levegőt, sugárzó hőt, szárazságot is jól viselő, gyönyörűen virágzó fa. Széles utcákba, ipari parkokba, szoliterként parkokba, nagyobb kertekbe.

Származás: Kelet-Ázsia 1772

Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' - Oszlopos csörgőfa



Növekedés, alak: Karcsú, zárt oszlop alakú korona. 7-8 méter magas, 1-2 méter széles, sötét, sárgásbarna vastag, kopasz vesszőkkel.

Levél: Hajtásai szőrösek, 20-35 cm-es levelei 7-15 levélkéjűek, 3-8 cm hosszúak, 3,5-4 cm szélesek, a levelek lekerekített ékvallúak, csipkésen, vagy kétszeresen fűrészesek, lefelé fokozatosan mélyülnek, hasogatottak, vagy szeldeltek. Közép zöldek, kopaszok. Ősszel narancs vagy lilás sárgára színeződnek.

Virág: Illatos felemás virágai 1 cm-esek, élénksárgák, 20-30cm-es, laza, szétálló bugákban június vége felé nyílnak.

Termés: Hólyagosan felfúj, 3 csúcsú termése előbb világoszöld, később világosbarna, majd barna, 3 magvú, 4-5 cm hosszú.

Termőhely, igény: Talajjal szemben igénytelen, fény és melegigényes. Kiváló szárazságtűrő és várostűrő.

Felhasználás: Kiváló utcai sorfa, keskeny utcákba.

Származás:

Liquidambar styraciflua - Amerikai ámbrafa



Növekedés: 12-20 m-re megnövő, sudaras, kúpos koronájú fa, vagy bokorfa. Ágai, vesszői többnyire erősen paralécesek, kissé bordás hajtásai vöröses barnák.

Levél: Tenyeresen 5-7 karéjúak, 12-18 cm hosszúak és szélesek. 5-7 háromszögletű, lándzsás, hosszan kihegyesedő, finoman fűrészes hasákkal. Illatosak. A kissé szíves vállú levelek felül fénylő sötétzöldek, kopaszok. A fonák matt zöld, a fő érzugokban szakállszőrös. A levélnyel 6-12 cm. Ősszel sárgás vagy lilás vörösre színeződnek.

Virág: Többnyire egylaki, zöldessárga, jelentéktelen, 1-1,5 cm átmérőjű fejecskeben, április-májusban nyílnak. A porzósak többesével, végálló fűzérben, a termősek egyesével, hosszú kocsányú, csüngő gömbökben.

Termés: 3 cm-es, csüngő. Októberben érik, tavaszig a fán marad.

Termőhely, igény: Üde, mélyrétegű, savanyú talajt kíván. Időszakos vízborítást elviseli. Fény- és melegigényes.

Felhasználás: Mutatószoliter fa.

Származás: USA déli része 1753

Liriodendron tulipifera - Amerikai tulipánfa



Növekedés, alak: 20-30 m magas, sudaras kúpos, később terebélyes koronájú fa. Kérge szürke, sekélyen repedezett. Vesszői világos-barnák, zöldes hajtásai kopaszok.

Levél: 3 karéjú, 7-15 cm hosszúak és szélesek, a középső karéj hiányzik, a hosszú hajtásokon mélyen karéjosak. A levélnyel 5-10 cm hosszú, a levéllemez üde zöld. Őszi lomb színe aransárga, majd barna.

Virág: Felálló, 6-10 cm átmérőjű, tulipánszerű virágai júniusban nyílnak. A 3-5 cm-es lepellevelek zöldes vagy kénsárgák, a tövüknél narancssárga rajzolattal. Az alsó 3 csészeszerű, zöldes fehér lepellevél tojásdad alakú, kicsípett csúcsú és visszahajló. A porzószálok spirálisan állnak, 1 cm-esek.

Termés: Világos barna termés csoportja 6-8 cm hosszú, az aszmagok 2,5-3,5 cm-esek, hegyes csúcsúak, októberben érnek, tavaszig díszítenek.

Termőhely, igény: Meleg, pára és fénykedvelő. Száraz talajra nem való.

Felhasználás: Szabad állásba, vagy kisebb csoportokba, parkokba, sorfának tiszta és párás levegőjű széles utak mellé.

Származás: Észak-Amerika keleti része

Liriodendron tulipifera Fastigiata - Oszlopos amerikai tulipánfa



Növekedés: 15 méter magasra is megnő. Keskeny, kúp koronájú. Fiatal korban karcsú oszlop, később ágai kuszává válhatnak.

Levél: 3 karéjú, 7-15 cm hosszúak és szélesek, a középső karéj hiányzik, a hosszú hajtásokon mélyen karéjosak. A levélnyél 5-10 cm hosszú, a levéllemez üde zöld. Őszi lombszíne aranyárga, majd barna.

Virág: Felálló, 6-10 cm átmérőjű, tulipánszerű virágai júniusban nyílnak. A 3-5 cm-es lepellevelek zöldes-, vagy kénsárgák, a tövüknél narancssárga rajzolattal. Az alsó 3 csészeszerű, zöldes fehér lepellevelel tojásdad alakú, kicsipett csúcsú és visszahajló. A porzószálok spirálisan állnak, 1 cm-esek.

Termés: Világos barna termés csoportja 6-8 cm hosszú, az aszmagok 2,5-3,5 cm-esek, hegyes csúcsúak, októberben érnek, tavaszig díszítenek.

Termőhely, igény: Meleg és fénykedvelő. Száraz talajra nem való.

Felhasználás: Szoliter növényként ültethető.

Származás:

Magnolia kobus - Japán liliomfa



Növekedés: 6-10 m magas, 4-8 m, kezdetben kúpos, majd idősebb korban gömbölyded koronájú bokorfa vagy fa. A törzs kérge szürke, az ágaké barnás. A hosszú, zöld hajtások kopaszok. A nagy, zömök virágrügyek már ősszel kialakulnak, erősen szőrös murvalevelek borítják.

Levél: Levelei megnyúlt elliptikus, vagy visszás tojásdadok, röviden kihegyezett csúcsúak, ékválúak. A levél lemez felül fényes zöld, a fonák az ereken kezdetben pelyhes, később kopasz. 6-10 cm hosszúak, 3-8 cm szélesek, a levélnyél 1-1,5 cm. Őszi lombszíne sárga.

Virág: Lombfakadás előtt nyílnak felfelé álló, majd szélesre táruló fehér virágai, melyek 10 cm szélesek. A lapát alakú 6-9 nagyobb lepel levél 2 körben áll, a 3 alsó hamar lehull. Korán nyíló, kissé illatos, csillagszerűen szétálló szirmú virágai a fát beborítják.


Termés: Hengeres termés csoportja 10-20 cm hosszú, pirosak, a magvak sötétpirosak.

Termőhely, igény: Az enyhén lúgos talajt még elviseli, a tápdús, üde talajt kedveli. Napos vagy félárnyékos, a késő tavaszi fagyoktól mentes helyre ültessük. A hazai klímát legjobban elviselő liliomfa.

Felhasználás: Szoliterként kertekbe, parkokba, burkolatlan, gyér forgalmú utcákba sorfának is ültethető.

Származás: Japán

Malus 'Brandy Wine' - Telt virágú díszalma



Növekedés: 4-6 m magas, 2-4 m széles, feltörő növekedésű, kerekded koronájú fa.

Levél: Az egyszerű, tojásdad levél 4-5 cm hosszú, sötétzöld. Kihajtáskor vörösesbarna, majd mély sötétzöld. A nagyobb leveleken 2-3 kiugró levélfog előfordul. A levélnyel és a levél színén a főér a levél kétharmadáig bordósbarna. Ősszel narancsvörös, mély bordó.

Virág: Dupla szirmkörös (2-3 szirm kör), mély rózsaszín majd rózsaszín, illatos. Gazdagon, április végén virágzik.

Termés: 3-4 cm átmérőjű, zöldessárga alapon pirossal bemosott.

Termőhely, igény: Jó víz elvezetésű talajokat, napos helyet kedveli.

Felhasználás: Parkok, kiskertek, kevésbé szennyezett, kisebb városok. Légvezeték alá is ültethető fa.

Származás: Malus 'Lemoinei' és Malus 'Klehm's' hibridje, USA

Malus 'Hopa' - Vörös levelű díszalma



Növekedés, alak: 4-6 m magas és széles kis fa, felfelé törő laza, széles korona.

Levél: Kihajtáskor bronz vörös, elliptikus, röviden kihegyezett, élesen fűrészes szélű.

Virág: Április második felében virágzik, 4-5 cm átmérőjű virágai egyszerű, lilás-pirosak, kármin vörösek, elvirágzásig fakulnak. Középkorán virágzik, igen dúsan nyílik, szép színhatást ad.

Termés: 1,5-3 cm, termése gömbölyded, tűzpiros, enyhe narancs árnyalattal, húsa vöröses, a csészelevelek néha lehullnak.

Termőhely, igény: Átlagos körülmények között jól fejlődik.

Felhasználás: Kertekbe, parkokba szoliterként, vagy növénycsoportba.

Származás: USA 1920

Malus 'Liset' - Díszalma



Növekedés: 5-8 m-es nagy bokor, vagy kis fa, kezdetben zárt, felfelé törő koronával, mely később széthajló, laza 4-5 m széles, lekerekített. A vesszők sötét barnák.

Levél: 6-10 cm hosszú, elliptikus, vagy tojásdad, kisebb karéjú levelei kihajtáskor bíbor vörösek, majd bronzos, fénylő sötétzöldek.

Virág: Bimbóban mély sötétpiros, kinyílván 3-4 cm széles, 5-6 szirmú, nem fakuló, lilás piros virágai áprilisban nyílnak. A virágníllás csodálatos színhatású, már fiatalon is rendkívül bőven és korán virágzó fajta.

Termés: Kocsánya 4-5 cm hosszú és sötétlilás vörös. A termés 1-1,5 cm széles lapított gömb alakú, csészelevél nélküli, gránát vörösek, vagy rubin pirosak, kissé kékes hamvasak. Október végéig a fán maradnak.

Termőhely, igény: A szélsőséges termőhelyi viszonyok kivételével mindenhol jól fejlődik. Napos helyre ültessük.

Felhasználás: Szoliter bokor, vagy fa. Vezeték alá - kis koronája miatt - ültethető sorfa.

Származás: Hollandia 1952

Malus sargentii 'Gyöngyvér' - Törpe díszalma



Növekedés: 2,5-4 méter magas és ugyan ilyen széles, szétálló ágú, gömbölyded koronájú kis fa vagy bokor. A vesszők sötét vöröses barnák. Tömött növesű.

Levél: 5-8 cm hosszú, elliptikus, enyhén kihegyesedő, kissé ráncos felületű, világos zöld. Kezdetben a fiatal hajtás és levél szőrös, majd lekopaszodó. A levelek csak a hosszú hajtásokon 3, ritkán 5 karéjosok.

Virág: Fehéres bimbóból nyíló fehér virágai 2,5 cm szélesek, egyszerűek. Rendkívül gazdagon virágzik, április végén, május első napjaiban.

Termés: Borsó nagyságú, 0,8-1 cm-es, gömbölyű, lehulló csésze levelekkel. A sok, fényes piros- sötétvörös termés szeptembertől november végéig díszít.

Termőhely, igény: Fény és meleg kedvelő. Középkötött, tápanyaggal gazdagon, vízzel közepesen ellátott talajokat kedveli. Kémhatásra közömbös, az enyhén lúgos és enyhén savas talajokon is jól fejlődik.

Felhasználás: Parkba, kertbe ajánlott szoliter növény.

Származás: Magyarország 2004

Malus tschonoskii - Díszalma



Növekedés: 8-10 m magas, 4-6 m széles, feltörő, kúp koronájú fa. A kéreg bíborbarna, érdes, repedezett.

Levél: Széles tojásdadok, 12 cm hosszúak, 7,5 cm szélesek, hegyesek, durván fogazottak. Fiatalon szürkés halványzöldek, nemezesek, később felületük sima, fényes zöldesszürke, a levélfonák finoman molyhos. Őszi lombszíne lazacvörös.

Virág: Bimbóban halvány rózsaszín, majd kinyílván fehér, 3 cm-es sárga portokú. Öttagú csomókban nyílnak.

Termés: Kerek, sárgászöld, pirosodó. 3 cm-es, paraszemölcsös. A csészelevelek nem hullanak le.

Termőhely, igény: Fény- és melegkedvelő. Középkötött, tápanyaggal gazdagon, vízzel közepesen ellátott talajokat kedveli.

Felhasználás: Toleráns. Széles utak, parkok, terek, nem túl szennyezett ipari területek sorfája.

Származás: Japán

Mespilus germanica - Kerti naspolya



Növekedés: 3-5 m magas bokor, vagy alacsony törzsű fa. Sötétszürke kérge nagy lapokban válik le. A hajtások fiatalon barnás molyhosak.

Levél: A 6-12 cm levelek szórt állásúak, hosszúkásak, röviden kihegyezett csúcsúak, megnyúlt ék vállúak, igen rövid levélnyéllal. A levél lemez széle finoman fűrészes, majdnem ép, felül fénytelen sötétzöld, a fonák sűrűn fehérén molyhos. A lomb szín ősszel sárga vagy rozsdabarna.

Virág: A rövid kocsányú, 3-5 cm széles fehér virágai többnyire magányos, a rövid hajtások csúcsán május - júniusban nyílnak. A kerekded szirmok száma 5, a piros portokú porzóké 25-40. A csészelevelek nemezesek.

Termés: Barna csontár alma termése lapított gömb, vagy lapos körte alakú, az egyik végén csúcsosodó, másik végén 5 keskeny, 1-3 cm hosszú csészelevél látható. Éretten belseje kásás, benne 5 kő maggal.

Termőhely, igény: Kissé kötött, közepes víz ellátású talajt, napos és meleg helyet igényel.

Felhasználás: Főleg házi kertbe ültessük dekoratív virágzása és ehető termése miatt.

Származás: Dél-Európa, Kis-Ázsia, Irán

Morus alba 'Pendula' - Csüngő eperfa



Növekedés, alak: Kisméretű, 4-5 m magas, erősen lecsüngő ágú fa. Vesszői hamar a talajig érnek. Kérge világoszürke, később hosszán repedezett. Vesszői világossárgás szürkék, fehér paraszemölcsösek. Fiatal hajtásai kopaszok.

Levél: Leveli 6-15 cm hosszúak, változatosak, 3 érűek, széles tojásdadok, a hosszú hajtásokon változatosan karéjosak, vagy mélyen 3-5 osztatúak. Csúcsuk hegyes, vagy röviden kihegyezett. A levéllemez vékony, sima, fényes világoszöld. A levélnyel 1-2,5 cm hosszú. Lombja ősszel sárgára színeződik.

Virág: Zölde virágai májusban nyílnak. A termős virágzat 5-10 mm hosszú, a porzós 10-20 mm-es.

Termés: Ehető, édes epergyümölcse 1-2,5 cm hosszú, feketés bordó, festő levű, szemetel.

Termőhely, igény: Talaj iránt igénytelen, mészkedvelő. A sovány, homokos talajokon is jól fejlődik.

Felhasználás: Kertek, parkok szoliter növénye.

Származás: